

衛生家寶產科備要

衛生家寶產科方目錄

卷一

產圖

入月安產圖

體聖祖御名子借地法

禁草法

禁水法

產前將護法

產後將護法

逐月安產藏衣并十三神行遊法

催生符

符貼式

保生圓

當歸圓

當歸建中湯

卷二

孫真人養胎論

徐之才逐月養胎方

烏雌雞湯

補胎湯

艾葉湯

黃連湯

雄雞湯

茯神湯

菊花湯

調中湯

阿膠湯

安中湯

麥門冬湯

柴胡湯

葱白湯

杏仁湯

芍藥湯

葵子湯

半夏湯

豬石湯

丹參膏

甘草散

千金圓

蒸大黃圓

滑胎令易產方

卷三

論初妊娠

竹茹湯

人參散

地黃圓

阿膠散

保安散

神妙千金圓

論欲產并產後

琥珀散

催生通靈散

七寶散

牡丹飲子

單方黑神散 芍藥湯

定痛散 四順理中圓

玉露散

卷四

二十一論并增入十八論 郭稽中附方

黑神散 蒲黃黑神散

奪命丹 勝金散

清魂散 見現圓

增損四物湯 調經散

七珍散

調中湯

赴痛散

麻仁圓

黑神圓

固經圓

巨勝湯

大巖蜜湯

小續命湯

濟危上丹

論臨月將息

論新生小兒

并小兒方肆道

注唇膏

豆蔻散

蝎梢散

治齁喘

累用經効方

大聖澤蘭散

奪命褐散子

地榆降血飲子

大安胎飲子

吳白朮散

滑胎榆白皮方

催生并死胎方

難產方

橫生逆生方四道

妊娠煩悶胎熱方

妊娠傷墜胎動方

胎動口噤唇青方

胎動下血心腹脹方

產後血暈方四道

產後中風方

產後發狂方

產前傷寒方

卷五

產科雜方

催生如聖散 救生散

罩胎散

二聖散

羌活散

黃金散

薑粉散

香連散

地黃散

香脂散

血竭散

十八論中治產前產後諸疾黑

神散功效

續添產前產後十八論烏金散功效

宣經圓

烏金散

產前所忌藥物

卷六

虞氏備產濟用方

妊娠

入月

臨產

產後

產後諸證用藥例

難產逆產橫產

胎衣不下

妊娠食忌

入月借地法

十二月產卧藏衣吉凶圖

產前諸方

川芎散

枳殼湯

蟹瓜湯

又方

又方

人參圓

保生圓

五積散

又方

順元散

催生神効聖功散

催生安胎救命散

神効催生丹

催生如聖圓

產後諸方

勝金湯

又方

又方

漬小便方

燒鹽法

百草霜散

又方

黑散子

烏金散

金黃散

麒麟竭散

千金散

地黃散

牡礪散

桃仁散

川芎散

金花散

當歸散

人參散

四神散

香桂散

當歸散

柿湯

荊芥散

陳梅散

難產方十二道

逆產方八道

橫產方六道

胎衣不下方七道

治產前產後痢疾方

許學士產科方

滑胎枳殼散

內補圓

木香圓

白朮散

紫蘇飲

下死胎方

琥珀散

佛手散

愈風散

交加散

蒲黃散

護胎方

又方

麻仁蘇子粥

鹿屑湯

治婦人死胎不下方

卷七

胎孕方

人參白朮散

千金半夏茯苓湯

枳殼散

陳逍遙水酒散

檳榔散

治胎不穩方

治姙娠墜傷胎動方

治胎動已死未死方

千金蟹爪湯 又方

葱白湯

白朮散

治妊娠傷寒大熱胎不安方

治妊娠傷寒大熱令胎不落方

治妊娠小便卒不通方

又方

產前方

榆皮滑胎散 黑神散

催生桂散

治難產或橫倒胎死方

治難產胎衣不下方

又方

又方

易產方

小琥珀散

下死胎方

下鬼胎方

治草蓐或產後血暈五絕中

風方

產後方

牛膝湯

當歸建中湯

聖功川芎湯

琥珀黑神散

通宣圓

八味黑神散

烏金散

劉寄奴飲

當歸一味散

荊芥一味散

秤槌酒

豆淋紫酒

產婦忽患寒熱方

治產後傷寒惡露不行方

傷寒產後惡露爲熱搏不行

宜服抵當湯桃仁承氣湯

桂心牡蠣湯

增損柴胡湯

人參散

治產後惡露不絕方

治產後洞泄惡物方

治產後下痢赤白膿血方

產後傷食宜服食藥感應圖

治吹妳腫硬方

治吹妳或兒絕妳後乳腫疼方

萬金散

通用四物湯

追命散

卷八

形初保育

小兒初生將護法

擇乳母法

乳兒法

乳母雜忌法

哺兒法

浴兒法

拭兒口法

斷臍法

灸臍法

裹臍法

甘草法

黃連法

豬乳法

藏衣法

剃頭法

襁謝法

初生不作聲

初生不喫奶

初生吐不止

初生有懸癰病

初生有重舌

葛氏肘後治卒重舌方

初生着噤

衛生家寶彙科方目錄

衛生家寶產科備要卷第一

產圖

入月安產圖

凡產於入月一日貼在卧閣內正北壁上

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布凡逐月安產藏衣避忌神煞方位並隨節氣更換候交得次月節即換次月產圖

凡產訖棄潑穢汚不淨之水並隨藏衣之方所向不拘遠近棄之切忌向閉肚之方也

體

聖祖御名

子借地法

東借十步

西借十步

南借十步

北借十步

上借十步

下借十步

壁方之中四十餘步安產借地恐有穢汚或有東海神王或有西海神王

或有南海神王或有北海神王或有
日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅
招搖舉高十丈天符地軸入地十丈
令此地空閑產婦某氏安居無所妨
礙無所畏忌諸神擁護百邪遠去急
急如律令勅

禁草法鋪草及氈褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王言得之
銅一言得之鐵母子相生俱篋鐵急

急如律令

禁水法欲產時貯水呪曰

南無三寶水

水在井中爲井水

水在河中爲河水水在器中爲淨水

水在法中爲真水自知非真莫當真水

以淨持濁

以正治邪

日遊月殺

五士將軍

青龍白虎

朱雀玄武

招搖天狗

軒轅女妖

天吞地吞

懸尸閉肚

六甲禁諱

十二神王

土符伏神

各安所在

不得動靜

不得忌干

若有動靜

若有忌干

施以神呪

當攝汝形

阿佉尼阿毗羅莫多梨娑地梨沙訶

產前將護法

按諸家產論云凡婦人妊娠入月不

可沐頭濕冷流于足太陽之經多令
子橫逆不順誠之誠之又切忌飲酒
恐產時心神昏亂臨產之時不可令
傍人喧擾大小倉忙慮致驚動產母
祇可令熟事產婆及穩審謹卓老成
親密三兩人扶持產母初覺腹痛且
宜任意坐卧勉強飲食恐致臨產氣
力虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可
按節次漸服滑胎榆白皮散壹貳服

服藥之法切勿太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍難即凭物而立須更扶策再行直至腹痛連腰相引作陣痛頻時即服催生丹壹服更且勉強扶行陣痛轉甚難以行立認是產時將至即服催生符畢然後安詳上草上草之時切勿傷早若太早則子在腹中難以轉側又須子細體候直待兒

逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不
得傾斜則兒得順其理自然易產也
又有卧產者亦待卧定背平着蓆體
不偃曲則子不失其道苟或不能依
此節適必致產難縱或幸免必須變
生諸疾

產後將護法

按經云婦人非止臨產須憂至於產
後大須將護勿以產時無他乃縱心

恣意無所不犯犯時微若秋毫感病
重於嵩岱且才得分免切忌問是男
是女看血下多少隨證服壓血運藥
良方喫粥服四順理中圓

方見第
二卷末便

令人從心下按至臍腹日伍柒次若
有疾證即隨證服藥粥藥相間頻頻
服餌且閉目而坐背後倚物左右看
承常令直立兩膝雖時眠睡頻令喚
覺過一伏時方得上床亦須立膝高

櫬床頭厚鋪衲褥遮圍四向窒塞孔
隙以禦賊風一膳之內常聞醋煙以
防運悶一膳之後漸加滋味或以羊
肉及雌鷄煮取濃汁作糜粥直至百
晬常服當歸圓當歸建中湯四順理
中圓日各壹兩服以養藏氣補血脈
兩膳之後方得食糜爛肉食滿月之
內尤忌任意飲食觸冒風寒恣情喜
怒梳頭用力高聲作勞工巧之類及

上廁便溺如此節養將攝以至百時
始得氣血和調腑臟平復設不依此
即致產後餘疾

逐月安產藏衣并十三神行遊法

東

野史

留公招攝

軒時蘇

感時池
吳天豐
狗隆

此

吉
衣

藏

母癸子壬亥

白虎

戌辛酉庚申

天候

食	坎	乾
震	正	兌
離	多	

巳丙午丁未

安產吉
狂虎



酉

北

咸池

大軒時轉

雷公見

丑癸子壬亥

鬼力

寅

卯

辰

巳

午

吉藏

甲

乙

丙

丁

戊

招搖

庚

辛

壬

癸

子

西

天候

天狗

豐豆隆

吳時

天德

南

東

天侯

招搖

寅 卯 辰 巳

坎 離 震 巽

北

虎 狂 虎 自 安 人 吉

丑 癸 子 壬 亥 人 吉

乾 兌 坤 艮

午 丁 未

天狗

丙 巳 藏 衣 吉

南

庚 申 辛 酉 壬 戌

震 兌

大 時 轉 西

吳 威 池 曲 隆

庚 申 辛 酉 壬 戌

東

吉衣藏

寅甲卯乙辰

運思力

時吳
隆虎
豐白

北

候天月

丑癸子壬亥

戌	坎	艮
辛	四	震
酉	南	巽
庚	午	丙
申	丁	巳

軒轅
大時

招搖
雷公

咸池
天狗

南

安產吉
祭虎吉

五十二

北

子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥

人夫
丑癸子壬亥
戌庚酉辛申
未丁午丙巳
辰乙卯甲寅
亥壬子癸丑
戌辛酉庚申
未庚午丁未
辰己卯甲寅
丑庚子癸丑
子辛壬亥
亥壬子癸丑
戌辛酉庚申
未庚午丁未
辰己卯甲寅
丑庚子癸丑
子辛壬亥

兌
坎
離
震
巽
艮
坤
乾

戌
辛
酉
庚
申

寅
甲
卯
乙
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥

西

天
狗
候

未
丁
午
丙
巳

藏衣吉
招搖
狂虎
南

北

咸池

大軒
時轉

丑癸子壬亥

鬼力大

寅夫人

甲安產吉

卯虎

辰

食

震

巽

巳

天候

坎

六

離

午

南

兌

兌

多

未

招搖
豐隆

吳時

戌

辛酉

天狗

庚申

藏衣吉

南

丑癸子壬亥

海

金

宙

天候

震

七

沈

學

丙

五

E

兩

未

藏衣土

辰乙卯甲寅

夫入東

自况

咸池吳時豐隆天狗

井

大軒
時轉
西

正

其

—B—

海國圖志

北

吳時

豐隆

天狗

天候

丑癸子壬亥

癸亥

寅

甲寅 戴奎 東

乙卯 夫人

辰 運鬼力

巳

午

未

巳 雷公 白虎

坎

八

離

丙

軒轅 大時

南

兌

兌

艮

丁

咸池

戌

辛

庚申

酉 招搖 西

壬子星耀

公雷

東時

時辰
豐隆

寅甲卯乙辰

巳

午

未

巳夫人
丙安產吉

北

狗亥吉

天戴

丑癸子壬亥

坎

九

南

丁未

午白虎狂虎

南

戌辛酉庚申

招羅

西

天德

北

天狗

雷公

咸池

大軒時轉

招搖

鬼力

丑癸子壬亥

寅

甲

坎

乾

安產吉

甲

震

十

兌

東

卯

巽

離

未

乙

巳

午

丁

天候

夫人

吳時白虎

豐隆

南

辛酉

庚申

藏

西

吉

東

天猴

寅甲卯乙辰

大德藏衣加

南

巳

藏衣吉

午

丁

夫人

未

大德藏衣加

震

離

兌

震

土

兌

坎

坎

兌

丑癸子壬亥

招搖安陸
狂虎

北

庚申辛酉

豐隆
咸池
大時
軒

西

北

吳時

豐隆招搖

天候

丑癸子壬亥

戌

辛酉

庚申

申

兌

坎

十二

離

震

巽

未

丁

午

丙

巳

寅

甲

卯

乙

辰

遷

鬼

力

子

吉未藏
東天狗

雷公

軒轅
大時

咸池

夫人
安產吉
白虎
經虎
西

南

催生符

麗 出

弱

弱

右件符用水飛朱砂書之

符貼上寫者式

催生治產難靈符每遇產婦將欲上
草時燈焰上燒灰不得飛揚了急投
盞中用淨水溫調服須臾即產

保生圓養胎益血安和子臟治妊娠將
理失宜或因勞役胎動不安腰腹痛重

胞阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成
胎或受妊不能固養痿燥不長過年不
產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨
產節適乖宜驚動太早產時未至惡露
先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛
極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷
口唇青黑吐出冷沫新產惡血上衝運
悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹疔
痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面

黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成羸勞
入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易
產產後常服滋養血氣和調陰陽密腠
理實腑臟治風虛除痼冷

甘草

炙微赤剉

貝母

剉

乾薑

炮剉

秦椒

去目及閉口者微炒出汗

桂

去麤皮不見火

黃芩

剉尖如錘者

石斛

去根

石膏

細研如粉

粳米

大豆黃卷各壹分

當歸半兩

去蘆頭酒浸壹
宿剉碎微炒

麻子仁壹兩半

右拾貳味爲末煉蜜爲圓如彈子大
每服壹圓溫酒或棗湯化下嚼亦得
空心食前

當歸圓治產後虛羸及傷血過多虛
竭少氣臍腹俱急痛引腰背面白脫色
嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒
熱頭重目眩可思飲食或勞傷衝任內

積風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

當歸去蘆頭酒浸壹宿剉碎微炒

芎藭洗剉續斷洗去根

乾薑炮阿膠剉碎蛤粉炒令泡起篩去蛤粉用

甘草微炙各肆兩白朮切焙

白芷去稍剉附子炮烈去皮各叁兩

桂去蘆皮剉不見火白芍藥各貳兩

熟乾地黄拾兩

酒浸壹宿
浪乾劉焙

真蒲黃叁兩半

隔紙
微炒

吳茱萸叁兩

湯浸
控乾微炒

右壹拾肆味搗羅為末煉蜜為圓如
梧桐子大每服貳拾圓食前以溫酒
下漸加至伍拾圓

當歸建中湯治婦人一切血氣虛損
及產後勞傷虛羸不足腹中疼痛吸吸
少氣小腹虛急痛引腰背時自汗出不

思飲食

當歸肆兩

去蘆頭酒浸
壹宿切焙

桂參兩

去麋皮劉

白芍藥陸兩

劉

甘草貳兩

炙劉

右為麋散每服參錢水壹盞半入生

薑伍片棗壹枚擘破同煎至壹盞濾

去滓熱服空心食前產訖直至滿月

每日參服令人丁壯

如頭痛眼目眩暈加
川芎貳兩防風壹兩

衛生家寶產科備要卷第一

衛生家寶產科備要卷第二

孫真人養胎論

論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和情性節嗜慾庶使清淨生子皆良長壽忠孝

仁義聰惠無疾斯蓋文王胎教者也
論曰兒在胎日月未滿陰陽未備腑藏
骨節皆未成足故自初訖于將產飲食
居處皆有禁忌

妊娠食羊肝令子多厄

妊娠食山羊肉令子多病

妊娠食驢馬肉延月

妊娠食騾肉產難

妊娠食兔肉犬肉令子無音聲并

缺唇

姪娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡
姪娠食雞肉糯米令子多寸白蟲
姪娠食棋并鴨子令子倒出心寒
姪娠食雀肉并豆醬令子滿面多
黥黥黑子

姪娠食雀肉飲酒令子心經情亂
不畏羞恥

姪娠食鼈令子項短

姪娘勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御
 宜食大麥無食腥辛是謂才正

姓娠一月足厥陰脉養不可針灸其經
 足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之
 時血行痞澀不爲力事寢必安靜無急
 畏姓娠一月陰陽新合爲胎寒多爲痛

熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所
下當預安之宜服烏雌雞湯

烏雌雞湯

烏雌雞壹隻治如食法

茯苓去黑皮 阿膠剉碎 各貳兩

芍藥白者 白朮去蘆

人參去蘆 各參兩 甘草炙

生薑洗去皮切 各壹兩 吳茱萸壹升揀去梗

麥門冬伍合湯泡去心 照焙乾

右拾味咬咀以水壹斗貳升煮雞取
汁陸升去雞下藥煎取參升內酒參
升并膠烱盡取參升放溫每服壹升
日三次服

若曾傷一月胎者當預服補胎湯

補胎湯

細辛壹兩

高麗者
去葉

生薑肆兩

洗探去
皮切碎

烏梅壹升

搥碎

防風貳兩

去蘆

乾地黄

洗照劉
焙乾

白朮

去蘆

各叁兩

大麥炒

吳茱萸揀淨各伍合

右捌味㕮咀以水柒升煮取貳升半
分參服食前服寒多者倍細辛茱萸
若熱多渴者去細辛茱萸加桔樓根
貳兩若有所思去大麥加栢子仁參
合一方有人參壹兩

● 娠二月名始膏無食辛臊居必靜
處男子勿勞百節皆痛是爲胎始結
娠二月足少陽脉養不可針灸其經

足少陽內屬於膽主精二月之時兒精成於胞裏當謹護驚動也

妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾葉湯主之

艾葉湯

艾葉

去梗

丹參

洗

當歸

洗去蘆須切片焙

麻黃

不去節

各貳兩

人參

去蘆頭切

阿膠

碎

各參兩

甘草壹兩

炙

生薑陸兩

洗擦去皮切

大棗拾貳枚

去核

右玖味咬咀以酒參升水壹斛煮減半去滓內膠煎取參升分參服一方用烏雌雞壹隻宿肥者治如食法割頭取血內參升酒中相和雞以水壹斛貳升先煮取汁去雞內藥煎取參升內血酒并膠煎取參升分作參服

若曾傷二月胎者當預服黃連湯

黃連湯

黃連去須

人參去蘆切 各壹兩

吳茱萸伍合揀淨 生薑叁兩洗擦去皮切碎

生地黃伍兩一方用阿膠

右伍味咬咀以酢漿柒升煮取叁升
分肆服日叁夜壹一作若頗覺不安加烏梅壹升
加烏梅者不用漿
只用水耳一方用當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

妊娠三月手心主脉養不可針灸其經手心主內屬於心無悲哀思慮驚動

妊娠三月爲定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛或腰背卒

有所下雄雞湯

雄雞湯

雄雞壹隻

治如食法

甘草

炙劉

人參

去蘆切片

茯苓

雪白者去皮

阿膠

剉碎

各貳兩

黃芩

尖如錐者

白朮

去蘆

各壹兩

麥門冬伍合

湯浸去心照焙乾

芍藥肆兩

洗

大棗拾貳枚

去核

生薑壹兩

洗擦去皮

右拾壹味㕮咀以水壹斛伍升煮雞

減半出雞內藥煮取半內清酒參升并膠煎取參升分參服一日盡之當溫卧一方用當歸芍各貳兩不用黃芩生薑

若曾傷三月胎者當預服茯神湯

茯神湯

茯神

去木

丹參

洗

龍骨

五色緊者

各壹兩

阿膠

剉碎蛤粉炒起去粉用

當歸

洗去蘆須切焙

甘草

炙坐

人參

去蘆頭

各貳兩赤小豆貳拾壹粒

大棗貳拾壹枚

去核

右玳瑁咬咀以酢漿壹斗煮取叁升分肆服先食服七日後服一劑腰痛

者加桑寄生貳兩

深師有薤白貳兩麻子壹升

妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡

妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經

手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心下愠愠欲嘔胃膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫脅心煩不得安卒有所下菊花湯

菊花湯

菊花壹握

如雞子大

麥門冬壹升

湯浸去心焙

麻黃

不去節

阿膠

剉碎

各參兩

甘草

炙剉

當歸

洗去蘆須切焙

各貳兩

人參壹兩半

去蘆頭切

生薑伍兩

洗擦去皮切碎

半夏肆兩

湯浸七次薑麩一宿

大棗拾貳枚

去核

右拾味㕮咀以水捌升煮減半內清

酒參升并阿膠煎取參升分參服溫

卧當汗以粉粉之護風寒四五日一

方用烏雌雞壹隻煮水煎藥

若曾傷四月胎者當預服調中湯

調中湯

續斷

去根洗焙乾

芎藭

洗坐

甘草

炙

各壹兩

白朮

去蘆切焙

柴胡

去蘆洗

厚朴

削去皮生薑搗碎
罌一宿次日焙乾

枳實

去穢炒

生李根白皮

洗各叁兩

白芍藥

雪白者剉

生薑

洗云皮切

各肆兩

當歸壹兩半

洗去蘆須

烏梅壹升

搥碎

右拾貳味呔咀以水壹斛煮取叁升

分肆服日叁夜壹八日後復服一劑

難方二
妊娘五月始受火精以成其氣卧必晏
起沐浴浣衣深其居處厚其衣裳朝吸
天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和
以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟
妊娘五月足太陰脉養不可針灸其經
足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆
成無大飢無甚飽無食乾燥無自灸熱
無大勞倦

妊娘五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒

苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛
寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有
所下阿膠湯主之

阿膠湯

旋復花貳合

去枝梗

阿膠肆兩

剉碎

人參壹兩

去蘆頭切

麥門冬壹升

湯浸去心焙

生薑陸兩

洗擦去皮切

吳茱萸柒合

揀淨湯洗三次焙

黃芩

尖如錐者

當歸

洗去蘆須切片子焙

芍藥

雪白者剉

甘草

炙

各貳兩

右拾味咬咀以水玖升煮藥減半內
清酒參升并膠微火煎取參升半分
肆服日參夜壹先食服便愈不差再
服一方用烏雌雞壹隻割取咽血內
酒中以水煮雞以煎藥減半內酒并
膠煎取參升半分肆服

曾傷五月胎者當預服安中湯

安中湯

黃芩壹兩

尖如錐者

當歸

洗去蘆須切片焙

芎藭

洗剉

人參

去蘆頭切

乾地黄

洗淨焙乾用

各貳兩

甘草

炙剉

芍藥

雪白者

各叁兩

生薑陸兩

洗擦去皮切碎

麥門冬壹升

湯泡去心焙

大麻仁伍合

去殼

五味子伍合

揀去枝梗

大棗叁拾伍枚

去核

右拾貳味咬咀以水柒升清酒伍升

煮取叁升半分肆服日叁夜壹七日

復服壹劑

姙娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紉筋以養其力以堅背膂

姙娠六月足陽明脉養不可針灸其經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大飽姙娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如

欲產手足煩疼宜服麥門冬湯

麥門冬湯

麥門冬壹升

湯浸去心

人參

去蘆切片

甘草

炙剉

黃芩各貳兩

乾地黄叁兩

洗焙

阿膠肆兩

生碎

生薑陸兩

洗擦去皮

大棗拾伍枚

去核

右捌味㕮咀以水柒升煮減半內清

酒貳升并膠煎取叁升分叁服中間

進糜粥一方用烏雌雞壹隻煮水以

煎藥

若曾傷六月胎者當預服柴胡湯

柴胡湯

柴胡肆兩

去蘆洗焙

芍藥

雪白者一方作紫葳

白朮

去蘆切焙乾

甘草

多各貳兩

茯苓壹兩

酒浸一宿切碎焙

麥門冬

湯浸去心焙

芎藭

洗

各貳兩乾地黄伍兩

洗淨焙

生薑陸兩

洗擦去皮切片

大棗叁拾枚

去核

右拾味㕮咀以水壹斗煮取叁升分

肆服日叁夜壹中間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服壹劑

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳以密腠理是謂養骨而堅齒

妊娠七月手太陰脉養不可針灸其經手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗

浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下
手足厥冷脉若傷寒煩熱腹滿短氣常
苦頸項及腰背強葱白湯主之

葱白湯

葱白拾肆莖

長三寸四寸

麥門冬壹升

湯浸去心焙

生薑捌兩

洗擦去皮切片

甘草

炙剉

當歸

洗去蘆頭切片子焙

黃耆

銚褊蜜塗炙

各叁兩

人參壹兩半

去蘆切片

阿膠肆兩

剉碎

黃芩壹兩

尖如錐者

旋復花壹合

去枝梗

半夏壹升

湯泡洗七次用生薑製一宿焙乾

右拾壹味咬咀以水捌升煮減半內清酒叁升及膠煎取肆升服壹升日叁夜壹溫卧當汗出若不出者加麻黃去節貳兩煮服如前法若秋後勿強漬汗一方以黃雌雞壹隻割咽取血內酒中煮雞取汁以前煎藥

若曾傷七月胎者當預服杏仁湯

杏仁湯

杏仁

湯浸去皮尖

甘草

炙

各貳兩

麥門冬

湯浸去心焙

吳茱萸

揀淨湯洗三兩次焙各壹升

鍾乳

使煉成者粉尤勝生鍾乳

乾薑

炮烈

各貳兩

粳米伍合

紫菀壹兩

使茸

五味子叁合

去梗

右玖味咬咀以水捌升煮取叁升半
分肆服日叁夜壹中間進食七日服
壹劑一方用白雞壹隻煮汁煎藥

姙娠八月始受土精以成膚革和心靜
息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色
姙娠八月手陽明脉養不可針灸其經
手陽明內屬於大腸主九竅八月之時
兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍
大起

姙娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛
乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍
下寒時時小便白如米汁或青或黃或

使寒慄腰背苦冷而痛目眊眊芍藥湯主之

芍藥湯

芍藥

白者剉

生薑

洗淨去皮

各肆兩

甘草

炙剉

當歸

去蘆須洗切片子焙

白朮

去蘆焙

人參

去蘆切片

各叁兩

薤白壹升

切洗

厚朴貳兩

去皮生薑搗碎卷一宿焙

右捌味㕮咀以水伍升清酒肆升合煮取叁升分叁服日再夜壹一方用

烏雌雞煮汁以煎藥

若曾傷八月胎者當預服葵子湯

葵子湯

葵子貳升

陳洗淨

生薑陸兩

洗淨擦去皮切片

芍藥肆兩

雪白者坐

白朮

去蘆切焙乾

柴胡

去蘆洗焙

各參兩 大棗貳拾枚

去核

甘草貳兩

炙剉

厚朴貳兩

去皮生薑搗碎罨一宿焙

右捌味㕮咀以水玖升煮取參升分
參服日參十日壹劑一方用烏雌雞

壹隻煮水以煎藥

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處濕冷無著炙衣妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉側短氣半夏湯

半夏湯

半夏

湯泡七次以生薑貳兩番一宿

麥門冬

湯浸去心焙

各伍兩

當歸

去蘆須洗切片子烔

吳茱萸

揀淨湯泡洗三兩次焙

阿膠

用蛤粉炒

各參兩 乾薑壹兩

炮烈

大棗拾貳枚

去核

右柒味咬咀以水玖升煮取叁升去

滓內白蜜捌合微火上溫分肆服痢

即止一方用烏雌雞壹隻煮汁煎藥

若曾傷九月胎者當預服豬石湯

豬石湯

豬石壹具

剝去筋膜洗淨

白朮肆兩

去蘆切焙

茯苓

去黑皮

桑寄生

揀淨

乾薑

炮烈

乾地黄

洗淨焙

芎藭

洗焙

各參兩

麥門冬壹升

湯浸去心焙

大豆參合

略炒

附子壹枚

中者炮烈去皮臍切

右拾味咬咀以水壹斛煮石令熟去

石內諸藥煎取參升半分肆服日參

夜壹十日更壹劑

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地
氣於丹田故使關節人神皆備但俟時
而生

妊娠一月始胚二月始膏三月始胞四
月形體成五月能動六月筋骨立七月
毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月
諸神備日滿即產矣宜服滑胎藥入月
即服

養胎臨月服令滑易產丹參膏

丹參膏

丹參半斤

洗熬

芎藭

洗焙

當歸

洗去蘆須切焙

各貳兩

蜀椒伍合

炒少時以梔合定出汗若有熱者以大麻人伍合代

右肆味咬咀以清酒漉濕停一宿以成煎猪膏肆升微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取如棗許內酒中服之不可過服至臨月乃可服舊用常驗

甘草散令易生母無疾病未生二月
日預服過三十日行步動作如故兒生
墮地皆不自覺

甘草貳兩 炙剉 大豆黃卷 微炒

乾薑 炮烈 剉碎 黃芩 尖如 錐者

桂心 不見 火剉 大麥蘖 炒一方 用粳米

吳茱萸 揀去梗湯 洗參次焙 麻子仁 各參兩

右捌味爲細末每服貳錢酒調服日
參服白湯調亦得

千金圓主養胎及產難顛倒胞不出服
壹圓傷毀不下產餘病汗不出煩滿不
止氣逆滿以酒服壹圓良一名保生圓

甘草 炙剉

貝母 去心

秦椒 炒出汗

乾薑 炮烈斲碎

桂心 去皮不見火

黃芩 尖如錐者

石斛 去根剉

石膏 硬者不煨軟者火煨

粳米

大豆黃卷 炒 各陸銖

當歸拾貳銖

洗去蘆須切片子焙

麻子參合

右拾貳味爲末煉蜜和圓如彈子大
每服壹圓日參服用棗湯化下一方
用蒲黃壹兩

六
蒸大黃圓治妊娠養胎令易產

大黃參拾銖

蒸

枳實

剉去穰
炒

芎藭

洗剉
焙

白朮

去蘆切
焙乾

杏仁

湯泡
去皮

各拾捌銖

芍藥

白者
剉

厚朴

削去皮生薑
搗碎

乾薑

炮烈

各拾貳銖

吳茱萸壹兩

揀去梗湯泡洗三兩次焙

右玳瑁為末煉蜜圓如梧桐子大空腹酒下貳拾圓日叁服未効加圓數
滑胎令易產方

車前子壹升

水淘洗令淨焙乾隔紙炒

阿膠捌兩

剉碎蛤粉炒起去粉用

滑石叁兩

右叁味為細末飲湯調服壹錢日再服如生月可服之藥利九竅未產不得先服
衛生家寶產科備要卷第二